


شکستگی تنه استخوان ران

ویژه بیماران و همراهیان



کارگروه آموزش به بیمار بخش ICU

کد سند: Bh-Mn / pat edu pam / doc-04 / 05

بازنگری: ۱۴۰۳

دفعات بازنگری: ۵

www.bohloul.gmu.ac.ir

پیگیری پس از ترخیص

- ≤ بنا به دستور ۲ الی ۳ هفته پس از عمل جهت کشیدن بخیه ها به پزشک مراجعه نمایید.
- ≤ از روز سوم به بعد می توانید حمام بروید.
- ≤ بخیه ها را تمیز و خشک نگه دارید .
- ≤ تعویض پانسمان باید پس از ترخیص به صورت روز درمیان و توسط پرستار یا همراه بیمار که در بیمارستان آموزش دیده انجام شود.

علائم هشدار :

- ≤ در صورت داشتن علائم عفونت از جمله تب و لرز، قرمزی و خروج ترشح چرکی از ناحیه عمل شده و حساسیت در لمس به پزشک مراجعه کنید.
- ≤ در صورت تورم و درد غیر قابل کنترل، سردی و رنگ پریدگی انگشتان و بی حسی اندام سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.

www.mayoclinic.org

آدرس وبسایت :

www.Bohloul.gmu.ac.ir

شماره تماس: ۰۵۱-۵۷۲۳۶۸۳۳



جهت دسترسی به محتوای

فایل می توانید بارکد را با تلفن

همراه خود اسکن نمایید.

خطر عفونت بعد از جراحی

ممکن است پزشک معالج داروهای آنتی بیوتیک خوراکی برای شما تجویز کند تا بعد از مرخص شدن از بیمارستان تا مدتی از آنها در منزل استفاده کنید از قطع کردن آن بدون دستور پزشک خودداری کنید. در صورت داشتن علائم عفونت از جمله تب، لرز، قرمزی و خروج ترشح چرکی از ناحیه عمل شده و حساسیت در لمس به پزشک مراجعه کنید. بعد از جراحی ممکن است داروهایی داده شود تا از لخته شدن خون در پاها جلوگیری شود. به این داروها داروهای رقیق کننده خون می گویند. استفاده از این داروها ممکن است تا چند هفته بعد از جراحی هم ادامه پیدا کند.

فیزیوتراپی

در اوقات بیداری ورزش های مربوط به عضلات پا را طبق نظر پزشک و فیزیوتراپ انجام دهید تا جریان خون بهتر شود.

هر چه زودتر تحت نظر پزشک و فیزیوتراپ حرکات مفاصل زانو را شروع کرده ، می توان از وسایل کمک حرکتی مانند چوب زیر بغل و واکر استفاده کرد و محدودیت های توصیه شده برای فعالیت را رعایت کنید و به ناحیه عمل شده فشار وارد نکنید.

تنفس عمیق و سرفه کردن به خروج ترشحات از ریه کمک می کند.

شکستگی تنه استخوان ران

استخوان ران از محکم ترین استخوان های بدن است و شکستگی آن نیاز به وارد شدن نیروی زیاد دارد. معمولاً این نیروها در حین تصادفات وسایل نقلیه و سقوط از ارتفاع می تواند به بدن وارد شود.

علائم شکستگی ران

⇒ ران متورم، دردناک، تغییر شکل یافته
⇒ ناتوانی در حرکت دادن یا ایستادن
⇒ خون ریزی زخم باز و بیرون زدن استخوان از پوست و تجمع خون که باعث تغییر رنگ یا کبودی شدید ناحیه شکستگی می شود.
⇒ گرفتگی عضله ران گز گز کردن ران پا

درمان

⇒ در شکستگی های ران معمولاً اقدام اول جراحی می باشد و طی آن استخوان های شکسته به هم وصل می شود که بهترین زمان آن ۴۸ ساعت اول بعد از آسیب است تا عوارض کاهش یابد.

⇒ درمان غیر جراحی شکستگی استخوان ران به صورت کشش و سپس گچ گیری است که گاهی اوقات یک پین پایین تر از ناحیه قرار می دهند و حدود یک یا دو ماه پای بیمار به وزنه متصل می شود که با این کار استخوان جا به جا شده به جای اول خود باز می گردد .

مراقبت های قبل از عمل

⇒ شب یا صبح قبل از عمل موهای ناحیه عمل را به فاصله ۲۰ سانتی متر از هر طرف بزنید.
⇒ قبل از عمل توسط پزشک بخش ویزیت می شوید در آن زمان سابقه بیماری های قلبی، ارثی و داروهای مصرفی را به پزشک اطلاع دهید.
⇒ ناشتا بودن حداقل ۸ ساعت قبل از عمل واجب است.
⇒ داروهایی مثل آسپرین، رقیق کننده های خون، داروهای ضد التهاب باید از چند روز تا یک هفته قبل از عمل مصرف نشود.

مراقبت بعد از عمل

⇒ تسکین درد
⇒ درد در مدت کوتاهی پس از جراحی به سرعت کاهش می یابد.
⇒ بعد از ۲ الی ۳ روز اغلب فقط گاهی برای رفع سفتی و جهت بهبودی استخوان های شکسته مسکن تجویز می شود.
⇒ دخانیات را کنار بگذارید.
⇒ مصرف الکل را قطع کنید.
⇒ دخانیات را کنار بگذارید.
⇒ مصرف الکل را قطع کنید.
⇒ گرفتگی عضلات به داروهای مسکن طبق دستور پزشک نیاز پیدا می کنید.
⇒ برای کنترل درد با بلند کردن اندام عمل شده و استفاده از کیسه یخ می توان به کنترل درد و تورم کمک کنید.

⇒ با تغییر وضعیت و آرامش فکری و پرت کردن حواس به کاهش درد کمک کنید.
⇒ در صورت تورم و درد غیر قابل کنترل ، سردی و رنگ پریدگی انگشتان و فلج ، سریعاً به پزشک مراجعه کنید

خوردن و آشامیدن

⇒ تا چند ساعت نباید چیزی خورده شود.
⇒ بعد از چند ساعت، می توان پس از کسب اجازه از پرستار ابتدا چند قاشق آب به بیمار داد و اگر تحمل کرد و دچار ناراحتی نشد می توان بتدریج به او مایعات بیشتری داد.
⇒ بعد از اینکه رژیم غذایی برای بیمار شروع شد در صورت مبتلا نبودن به بیماریهای خاص (قلبی، تنفسی، دیابت و ...) از کلیه مواد غذایی می توان استفاده کرد.
⇒ برای بهبود باید بافت جدید ساخته شود که این نیاز به انرژی فراوان دارد و غذا باید سرشار از گلوکز ، چربی ، پروتئین، املاح و ویتامینها باشد.
⇒ یبوست از عوارض بعد از عمل می باشد که به دلیل کاهش حرکت و استفاده از مسکن ها رخ می دهد.
⇒ آب کافی، مصرف مواد غذایی حاوی فیبر از جمله سبزیجات، غلات، میوه، حرکت سریعتر و نرم کننده های مدفوع می تواند برای پیشگیری از یبوست مصرف شود.

